

CHUCHO PINTADO

CLASIFICACIÓN CIENTÍFICA

Reino : Animalia
Filo : Chordata
Clase : Chondrichthyes
Subclase : Elasmobranchii
Superorden : Batoidea
Orden : Myliobatiformes
Familia : Aetobatidae
Género : *Aetobatus*
Especie : *Aetobatus narinari*

ESTADO DE CONSERVACIÓN

EX EW CR EN VU **NT** LC
Extinta En Peligro Casi amenazada

Talla Máxima
3,3 metros (ancho del disco)
Talla Promedio
1,8 metros (ancho del disco)
Peso Máximo
230 kilogramos

REPRODUCCIÓN

Especie ovovivípara. Es decir, que sus huevos son incubados dentro del cuerpo de la madre y las crías nacen sin una fijación placentaria. Las hembras dan a luz a camadas de hasta 4 crías, cada una con una longitud aproximada de 25 centímetros (ancho del disco). El período de gestación es de 12 meses y la madurez sexual se alcanza a los cuatro años de edad.


DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA

Se encuentra en aguas templadas y tropicales.
Océano Atlántico Occidental: En Carolina del Norte y Florida (Estados Unidos), Golfo de México, Mar Caribe, Bermudas y al sur de Brasil.
Océano Atlántico Oriental: Desde Mauritania hasta Angola.
Océano Indo-Pacífico: En el Mar Rojo y desde Sudáfrica hasta Hawái, así como al norte de Japón y al sur de Australia.
Océano Pacífico Oriental: Desde el Golfo de California hasta Perú, incluidas las islas Galápagos.

Área de distribución

FORMACIÓN DE GRUPO

El chuco pintado viaja en grandes grupos de hasta varios cientos de individuos. Estas agregaciones se clasifican en dos: Agregaciones no estructuradas (grupo pequeño, con interacciones ocasionales entre los individuos) y estructuradas (seis o más individuos desplazándose en la misma dirección, a la misma velocidad).



Al nacer, las crías miden entre **17 y 35 centímetros (ancho del disco)**

HÁBITAT

Se observa comúnmente en bahías y lagunas, a menudo asociado a ecosistemas de arrecifes coralinos. Se ha registrado a profundidades de hasta 80 metros. Cuando no está alimentándose en la costa, se le puede encontrar en aguas abiertas, desplazándose en grandes grupos cerca de la superficie. Es capaz de migrar largas distancias a través de las cuencas oceánicas, aunque se sabe que muestra fidelidad por un mismo sitio a lo largo de su vida.

Océano Atlántico Océano Pacífico

TURISMO

Los avistamientos de esta especie son comunes en el Mar Caribe, México, las islas Galápagos y las Maldivas, donde se le ha otorgado protección legal debido a su valor para el ecoturismo. El chuco pintado es generalmente tímido y se mantiene alejado de los buzos. Su llamativa coloración y elegantes movimientos le convierten en una especie atractiva para disfrutar visualmente en cualquier destino de buceo.

COLORACIÓN

El patrón de manchas distintivo, similar al de un tiburón ballena y que se observa en la parte superior del cuerpo, hace que ésta sea una de las especies de rayas más populares del mundo. Las pequeñas manchas blancas se destacan al estar sobre el cuerpo negro, gris oscuro o marrón, y a veces se unen para formar líneas y círculos.


underwater 360

MARVIVA

SHARK BUSINESS


DEPREDADORES

El chuco pintado es presa de varias especies de tiburones, como los punta blanca, el tigre, el toro y los martillo. Se cree que el chuco pintado salta fuera del agua para escapar de sus depredadores, ya que se han observado haciendo esto en presencia de tiburones martillo. Además, se han visto tiburones siguiendo cardúmenes de chuchos pintado durante la temporada de parto y alimentándose de sus crías.



DIETA

Se alimenta principalmente de moluscos, cuya carne extrae de la concha triturándola con sus poderosas placas dentales. También consume camarones, crustáceos, pulpos, calamares y pequeños peces óseos.



MANDÍBULAS Y DIENTES

Tiene un hocico largo y ancho que se asemeja al pico de un pato, el cual utiliza para buscar invertebrados enterrados en la arena y el fango. Los dientes en las mandíbulas superior e inferior se combinan para formar placas trituradoras con forma de flecha, en cada una de ellas.

